

## Instrucciones de colonoscopia (CLENPIQ)

Fecha del procedimiento: \_\_\_\_\_ Seguir: \_\_\_\_\_

**El centro de cirugía llamará con el tiempo 2 días antes de la fecha de su procedimiento**

| FACILITY                          | ADDRESS                             | PHONE#       |
|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| ORANGE CITY SURGERY CENTER        | 975 Town Center Dr, Orange City FL  | 386-456-5247 |
| LAKE MARY SURGERY CENTER          | 460 ST Charles Court, Lake Mary FL  | 407-585-0263 |
| FHC PLANS SURGERY CENTER          | 2777 Enterprise Rd, Orange City FL  | 386-481-6282 |
| FL HOSPITAL FISH MEMORIAL         | 1055 Saxon Blvd, Orange City FL     | 386-917-5000 |
| CENTRAL FLORIDA REGIONAL HOSPITAL | 1401 West Seminole Blvd, Sanford FL | 888-894-2106 |

### INSTRUCCIONES:

- Continuar tomando medicamentos de rutina, incluida la presión arterial y medicamentos para el corazón.
- Si es diabético, solo tome la mitad de su dosis habitual la mañana del procedimiento.
- Antes de suspender cualquier diluyente de sangre, hable con su proveedor de recetas.
- Mantenga Coumadin, Plavix, Effient, Brilinta durante 5 días antes del procedimiento.
- Mantenga Pradaxa, Eliquis y Xarelto durante 2 días antes del procedimiento.
- 5 días antes, descontinúe los suplementos de hierro, las vitaminas o los suplementos de hierbas
- 5 días antes, no tome ninguno: Aleve, Motrin, Naproxen, Ibuprofen - Tylenol es seguro de usar
- **Debe tener un miembro familiar o amigo conducir a y desde la instalación. NO SE PERMITE NINGÚN TIPO DE SERVICIO DE TAXI.**

### DÍA ANTES DEL PROCEDIMIENTO:

**¡No coma ningún alimento sólido todo el día antes del procedimiento!**

Ten una dieta líquida clara durante todo el día. Evite los líquidos que son de color rojo o morado, como la uva roja o el jugo de arándano. Evite TODOS los productos lácteos y jugos con pulpa, como el jugo de naranja o pomelo. Puede beber líquidos claros (SIN COLORES ROJOS / OSCUROS) hasta 3 horas antes del procedimiento. En la marca de 3 horas, nada por la boca incluyendo agua. Puede tomar cualquier medicamento necesario con un pequeño sorbo de agua.

### **Los líquidos claros incluyen lo siguiente:**

**Sopas:** caldo (pollo, carne de res o vegetal)

**Zumos:** jugo de uva blanca, manzana, etc.

**Postres:** gelatina, hielo italiano, paletas heladas, etc.

**Bebidas deportivas:** Powerade, Gatorade, Propel

**Bebidas:** té, Kool-aid, agua, café negro

| Si tu procedimiento es antes de las 12PM   | Si tu procedimiento es después de las 12PM                                       |
|--|--|
| 1. A las 5:00PM, tome una botella de 5.4 onzas de CLENPIQ.                       | 1. A las 7:00PM, tome una botella de 5.4 onzas de CLENPIQ.                       |
| 2. Tomar (2) de más de 16 onzas de agua fría o Líquido Claro en la próxima hora. | 2. Tomar 2 de más de 16 onzas de agua fría o Líquido Claro en la próxima hora.   |
| 3. A las 11:00PM, tome una botella de 5.4 onzas de CLENPIQ.                      | 3. A las 6:00PM, tome una botella de 5.4 onzas de CLENPIQ.                       |
| 4. Tomar (2) de más de 16 onzas de agua fría o Líquido Claro en la próxima hora. | 4. Tomar (2) de más de 16 onzas de agua fría o Líquido Claro en la próxima hora. |

**Por favor permita un aviso de 5 días hábiles para la cancelación o habrá un cargo de \$ 200.**